

TUNNETTUUS

SUOMALAISISTA YLI
60-VUOTIAISTA VAIN

Lähde: The 2017 Heart Valve Disease Awareness Survey, Censuwide

6 % TUNTEE
LÄPPÄVIAN

4 % TIETÄÄ, MIKÄ AORTTA-
LÄPÄN AHTAUMA ON.

AORTTALÄPÄN AHTAUMAN TYYPILLISET OIREET



RASITUKSEN
AIKAINEN
RINTAKIPU



SYDÄMEN-
TYKYTYKYS



HENGENAHDISTUS



VÄSYMYS




HUIMAUUS /
PYÖRTYMINEN



VÄHENTYNYT
FYYSINEN
AKTIIVISUUS

DIAGNOOSI

SYDÄMEN KUUNTELU
VOI PALJASTAA
SIVUÄÄNEN




Lähes 50%:lla
yli 60-vuotiaista
lääkäri
kuuntelee
sydäntä harvoin
tai ei koskaan.

Lähde: The 2017 Heart Valve
Disease Awareness Survey,
Censuwide


1/8

JOKA KAHDEKSAS
YLI 75-VUOTIAASTA
SAIRASTUU

Vaikeaa aorttaläpän ahtaumaa sairastavat



elossa 2 vuoden kuluttua
oireiden alkamisesta



elossa 5 vuoden kuluttua
oireiden alkamisesta

Lähde: Ross J Jr, Braunwald E. Circulation 1968;38(1 Suppl):61-67.

HOITO

Lievä aorttaläpän
ahtauma ei edellytä
toimenpiteitä,
mutta tilannetta
on hyvä seurata.



Vaikea aorttaläpän
ahtauma hoidetaan
vaihtamalla aortta-
läppä uuteen.
Aorttaläppä voidaan
vaihtaa kirurgisesti

- avosydänleikkauksessa
- TAVI-toimenpiteellä,
jossa uusi läppä
asennetaan katetrin
avulla.

Lisää tietoa: sivuaania.fi